

# Manejo de la polilla de la papa


HOJA  
VOLANTE

## Reconociendo la polilla de la papa

La polilla de la papa es una plaga que ataca a la papa en la parcela y el almacén.

## ¿Cómo vive la polilla de la papa?

La polilla busca la oscuridad y la sombra. Pero no puede reproducirse si hace frío, menos de 10 grados. El almacén protege a la polilla del frío y de la lluvia. Los gusanos de las polillas van en la papa del almacén al campo, y del campo al almacén. La polilla llega de muy lejos en la semilla gusanada que uno compra.



*La polilla llega de lejos en la semilla que compramos*

## Cómo manejar la polilla de la papa

Revise su semilla antes de sembrarla, para ver que no tenga gusanos. Cuando compre semilla en el mercado, asegúrese que esté sana, y no picada.

Haga un aporque alto, porque una gran capa de suelo es una barrera para que los gusanos de la polilla no puedan llegar a las papas, y la polilla no ponga sus huevos en esas papas.

Lleve la papa rápidamente del campo al almacén. Si la deja en el campo, tápela con un toldo, para que no entre la polilla.



*Seleccione semilla sana para no llevar polilla a su parcela*

Lo más importante es mantener los sacos y el almacén limpios. Antes de guardar la papa, hay que barrer el piso, las paredes y el techo para matar a las polillas, pupas y huevos que se esconden. Revisar los sacos o costales para que no haya huevos, gusanos o pupas pegados. Revisar la papa de vez en cuando, y eliminar las gusanadas.

Cubrir la semilla de papa con una capa delgada de talco. Se ponen dos cucharadas de talco en un saco con una arroba de papa y dos personas agitan el saco para empolvar las papas. Compre el talco donde venden material de construcción. Pida uno que se llama carbonato de calcio. No use el talco de la farmacia, que es otro. El talco es un polvo no venenoso para la gente, pero le puede hacer daño si lo respira. El talco daña el estómago del gusano. Hay que lavar esa papa antes de cocinarla.

Después de cosechar papa, hay que sembrar otros cultivos por 3 años, para eliminar la polilla de esa parcela. Después de la papa se pueden sembrar pastos, cebada, avena, trigo, haba, chocho o tarwi, arveja, quinua, zanahoria y otros, porque la polilla de la papa no vive en estos cultivos.

Para que estas prácticas funcionen, hay que usar varias de ellas y coordinar con toda la comunidad. Si toda la gente de la zona lucha contra la polilla, se la puede manejar.

Autores: Jeff Bentley, Olivier Dangles

Agro-Insight, 2021

email: jeff@agroinsight.com

Teléfono: +591731343239

Contacto local:

Teléfono:

PROGRAMA COLABORATIVO DE INVESTIGACIÓN SOBRE CULTIVOS

LA FUNDACIÓN MCKNIGHT

**AGRO**  
insight  
communicating agriculture

Editado por Jeff Bentley  
y Paul Van Mele,  
Agro-Insight